507.45
G33D6

SMITHSON
FEB 11 19
LIBRARY

DORIANA

Supplemento agli

ANNALI DEL MUSEO CIVICO DI STORIA NATURALE "G. DORIA,,

GENOVA

Vol. I - N. 22 15 - II - 1952

DELFA GUIGLIA

I TIPI DI IMENOTTERI DEL GUÉRIN ESISTENTI NELLE COLLEZIONI DEL MUSEO DI PARIGI

(*Scoliidae - Thynnidae*)

Ho già trattato in un precedente lavoro (1) dei tipi di Imenotteri del Guérin appartenenti alle collezioni del Museo di Genova. Nella presente nota, elenco una parte di quelli conservati nel « Museum National d'Histoire Naturelle » di Parigi, dove, con tanta cortesia e larghezza di mezzi, fui recentemente ospitata.

Di alcune specie ho creduto utile riportare le relative diagnosi originali poichè so, per esperienza, quale grande perdita di tempo richieda e quale enorme difficoltà spesso presenti la consultazione di opere antiche, particolarmente nell'epoca attuale in cui la grande guerra ha disperso e distrutto tante preziosissime biblioteche.

Mi sono per ora limitata ad esaminare i tipi delle due famiglie: *Scoliidae* e *Thynnidae*. Conto di occuparmi dei rimanenti in un mio prossimo soggiorno al grande Museo parigino.

ELENCO DEI TIPI

SCOLIIDAE

Meria abdominalis: 1 ♀. Africa. Cart. autogr. (2): Mag. Zool., senza la dicitura: *tipo* (3).

---

(1) Delfa Guiglia. - I tipi di Imenotteri del Guérin esistenti nelle collezioni del Museo di Genova. - Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova, LXIII, 1948, pp. 175-191.

(2) L'abbreviazione: *Cart. autogr.* sta ad indicare che il cartellino è autografo del Guérin.

(3) La ♀ di Port Natal (Coll. Museo di Genova) già da me citata (l. c., p. 176) porta la dicitura « typus » ma certamente *non* di mano del Guérin.

Myzine aegyptiaca: 1 ♂. Nubia. Cart. autogr. (?), senza la dicitura: *tipo*.

« 7. *M. aegyptiaca*, Guér. (Myzine, Aud., Eg., pl. 15, fig. 27); reproduite dans notre Atlas, pl. 401, fig. 2. Tête noire, tachée de jaune. Prothorax jaune: mésothorax ayant quatre taches entre les ailes; l'écusson, une ligne en arrière et les flancs jaunes; ailes transparentes, incolores; pattes jaunes, tachées de noir; abdomen noir à larges bandes jaunes. Longueur, 10 millimètres. D'Egypte ». - M. F. E. Guérin Meneville. - Prodrome d'une Monographie des Myzines. - Extrait du Dictionnaire pittoresque d'histoire naturelle, t. V, p. 582, n. 7, ♂.

Myzine arabica: 1 ♂. Arabia (cart. autogr. dell'Olivier). Cart. autogr.: Mag. Zool., senza la dicitura: *tipo*.

« 10. *M. arabica*, Guér. Tête et antennes noires, sans taches, ponctuées et velues. Prothorax ayant deux larges bandes qui se réunissent de chaque côté; mésothorax taché de jaune sous les ailes; abdomen noir, avec la moitié postérieure des segments jaune. Pattes jaunes, ailes sans taches, transparentes. Longueur, 12 millimètres. D'Arabie », l. c., p. 583, n. 10, ♂.

Myzine aurantiaca: 1 ♂. Arabia (cart. autogr. dell'Olivier). Cart. autogr.: Mag. Zool., senza la dicitura: *tipo*.

« 8. *M. aurantiaca*, Guér. Tête noire, avec le chaperon et le premier article des antennes jaunes: prothorax jaune, avec un point noir au bord anterieur; mesothorax noir, avec l'écusson, un petit point en arrière, et les côtés orangés; metathorax noir, avec une grande tache de chaque côté. Abdomen noir, avec une large bande orangée en arrière de chaque segment en dessus et en dessous; pattes fauves; les antérieures jaunes. Ailes transparentes, un peu obscures au milieu. Longueur, 14 millimètres. D'Arabie ». l. c., p. 582, n. 8, ♂.

Myzine haemorrhoidalis: 1 ♂. Capo di Buona Speranza. Cart. autogr.: Mag. Zool. Cap, senza la dicitura: *tipo*.

« 3. *M. haemorrhoidalis*, Guér. Tête, antennes et corselet noirs, ponctués et velus; abdomen plus étroit à la base, noir, à extrémité rouge; deux petites stries au premier segment et une bande aux quatre autres, jaunes; ailes incolores; pattes fauves. Longueur, 12 millimètres. Du Cap de Bonne-Espérance ». l. c., p. 581, n. 3, ♂.

Myzine nigripes: 1 ♂ (dell'addome esistono solo frammenti dei primi quattro urotergiti, delle antenne una è ridotta allo scapo e ai primi quattro articoli del funicolo). Egitto (cart. autogr. dell'Olivier). Cart. autogr.: Mag. Zool., senza la dicitura: *tipo*.

« 13. *M. nigripes*, Guér. Tête, antennes, corselet et pattes très noirs, velus et ponctués; ailes brunes. Abdomen noir avec une petite strie jaune de chaque côté du bord postérieur. Longueur, 14 millimètres. D'Egypte ».
l c., p. 584, n. 13, ♂.

Myzine nodosa: 1 ♂. Madagascar. Cart. autogr.: Mag. Zool., senza la dicitura: *tipo*.

« 16. *M. nodosa*, Guér. Noire, couverte d'un duvet blanc; ailes transparentes; pattes fauves; premier segment de l'abdomen allongé, étranglé en arrière et noueux. Longueur, 11 millimètres. De Madagascar ».
l. c., p. 584, n. 16.

Myzine thoracica: 1 ♀ 1 ♂ (dell'addome del ♂ esistono solo frammenti dei primi due urotergiti). Arabia (cart. autogr. dell'Olivier). Cart. autogr.: Meria thoracica Guér., Voy. Coq. et Mag. Zool., IX, senza la dicitura: *tipo*.

Myzine sexcincta Fab. var. *A. obscuripennis*: 2 ♂♂. America settentrionale. Cart. autogr.: Mag. Zool.

Myzine sexcincta Fab. var. *F. affinis*: 1 ♂. Nord Capit.e di St. Paul. Cart. autogr.: Mag. Zool. du Nord de la Capit.e de St. Paul.

« 1. *M. sexcincta*, Fab. (*Sapyga maiorta*, Panz.). Noire, tachée de jaune; abdomen noir avec six bandes transverses jaunes. Longueur, 11 à 23 millimètres. Des Etats-Unis d'Amerique. Nous avons distingué six variétés assez tranchées, dont on pourrait à la rigueur former autant d'espèces (Var. A: *obscuripennis*, Guér.; B: *Maiorta* Panz.; C: *Menechma*. Guér.; D: *Apicalis*, Guér.; E: *Sexcincta*, Fab.; F: *Affinis*, Guér.) ».
l. c., p. 581, n. 1.

Myzine sexfasciata Rossi var. *C. brevicornis*: 1 ♂ (senza addome). Rhone Lyon. Cart. autogr.: Mag. Zool.

Myzine sexfasciata Rossi var. *D. capensis*: 1 ♂ Africa. Cart. autogr.: Mag. Zool.

Myzine sexfasciata Rossi var. *E. mauritiana*: 1 ♂. La Réunion Bréon. Cart. autogr.: Mag. Zool.

Myzine sexfasciata Rossi var. *F. fabricii*: 1 ♂. Rhone-Lyon. Cart. autogr.: Mag. Zool.

« 8. *M. sexfasciata*. Rossi (Myzine, Aud. Eg., pl. 15, fig. 25); représentée dans notre Atlas, pl. 401, fig. 1 (*Scolia sexfasciata*, Rossi; *Scol. cylindrica*, Fab.; *Scol. volvulus* Fab.; *Sapyga volvulus* et *cylindrica* Jurine). Noire; prothorax ayant deux bandes jaunes, et abdomen en ayant six. Pieds tachés de jaune. Longueur, 11 à 16 millimètres. Europe meridionale, Egypte. Nous avons distingué sept variétés réparties dans deux division comme il suit:

— Antennes plus longues que la moitié du corps.
Var. A: *Volvulus*, Fab.; B: *Antennata*, Guér.

— Antennes à peine de la longueur de la moitié du corps.
Var. C: *Brevicornis*, Guér.; D: *Capensis*, Guér.; E; *Mauritiana*, Guér.; F: *Fabricii*, Guér.; G: *Cylindrica*, Fab. ».
l. c., p. 576, n. 4.

THYNNIDAE

Tachypterus fasciatus: 1 ♂ (antenne con solo lo scapo e i primi quattro articoli del funicolo). Isole dei Canguri. Cart. autogr.: Ile Kanguro: *type*.

Thynnus Ephippiger: 1 ♀. Isole dei Canguri. Cart. autogr.: Thynnus ? Ephippiger Guér. Voy. Coquille. Mag. Zool., senza la dicitura: *tipo*.

Thynnus flaviventris: 1 ♂ (mancano le antenne, vi è una sola coppia di ali di cui l'anteriore molto deteriorata). Australia. Cart. autogr.: Voy. Coquille et Mag. Zool., senza la dicitura: *tipo*.